



歌手 クリス・ハート

お子さんの 風しん ワクチンは 2回。

きみが大好きだから、ワクチン接種で風しんから守りたい。

**2回のワクチン接種は、お子さんの風しん感染の予防と、
周囲への感染拡大を防ぐことにつながります。**

MRワクチン(麻しん風しん混合)の定期接種を受けましょう。

2回の接種を受けることで、より確実に風しんを予防することができます。

お問合せ先

厚生労働省

感染症・予防接種 相談窓口

TEL.03-5276-9337

受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日、年末年始を除く）

風しんについて、詳しくはこちら ▶



Q 風しん 厚労省

検索



2回目の風しんワクチンも 忘れないでください。

風しんとは

感染経路

風しんウイルスに感染した人の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。

症

小児

発熱や発しん、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になって、入院することがあります。

状

成人

関節が強く痛み、高熱や発しんが長く続くなど、症状が重くなることがあります。

●妊娠 20 週頃までに感染すると、おなかの中の赤ちゃんにも感染し、赤ちゃんが生まれつきの病気になることがあります。

予防するため

MR ワクチン(麻しん^{*}風しん混合)の定期接種を受けましょう。

1 回目 1 歳

2 回目 小学校就学前の1 年間 (5 歳以上 7 歳未満)

2 回の接種を
忘れずに
受けましょう。

2 回の接種を受けることで、
より確実に風しんを予防することができます。

MR ワクチン接種の目安

1 回目 1 歳

1

2

3

4

5

6

7

(歳)

2 回目 小学校就学前 1 年間
(5 歳以上 7 歳未満)

※麻しんについて

症 状：高熱や発しん、咳、鼻水、眼球結膜の充血など、風しんに似ていますが、より重い症状が出ます。
肺炎や脳炎になって、命に関わる場合があります。

感染経路：空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染します。

免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ 100% 発症します。

お問合せ先

厚生労働省

感染症・予防接種 相談窓口

TEL.03-5276-9337

受付時間：午前 9 時～午後 5 時(土・日・祝日、年末年始を除く)

Q 風しん 厚労省

検 索